PASSAGES RELATIFS A DES SOMMATIONS DE SÉRIES DE CUBES EXTRAITS DE...

Franz Woepcke

293
19

PASSAGES RELATIFS

A DES SOMMATIONS DE SÉRIES DE CUBES

EXTRAITS

DE DEUX MANUSCRITS ARABES INÉDITS

DU *BRITISH MUSEUM* DE LONDRES

COTÉS N^os^ CCCCXVII ET CCCCXIX DES MANUSCRITS ORIENTAUX
(N^os^ 7469 ET 7472 DES MANUSCRITS ADDITIONNELS)

PASSAGES RELATIFS
A DES SOMMATIONS DE SÉRIES DE CUBES

EXTRAITS

DE DEUX MANUSCRITS ARABES INÉDITS

DU *BRITISH MUSEUM* DE LONDRES

COTÉS N^os^ CCCCXVII ET CCCCXIX DES MANUSCRITS ORIENTAUX
(N^os^ 7469 ET 7470 DES MANUSCRITS ADDITIONNELS)

PAR M. F. WOEPCKE

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ORIENTALE ALLEMANDE
ET DE CELLE DE LA *société asiatique* DE PARIS,
DE MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE PONTIFICALE DES [illegible]

ROME
IMPRIMERIE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES
Via Lata N° 211 A
1864

Manuscrit coté CCCCXVII des manuscrits orientaux du British Museum (7469 des manuscrits additionnels).

Volume in-4° de 214 feuillets en papier. Le premier et le dernier (les 213 feuillets qui sont les feuillets de garde) et les trois feuillets qui précèdent le dernier feuillet de garde ne sont pas numérotés. Les 208 autres feuillets sont numérotés au crayon avec les numéros 1 à 204 à l'exception du 16e feuillet du volume, qui paraît avoir été sauté par inadvertance.

Les quatre feuillets qui précèdent le dernier feuillet de garde sont en blanc, au recto pas des notes détachées.

Tout le reste du Manuscrit est occupé par le commentaire du Chihâb Eddîn Aboû Abbâs Ahmed Ben Abdallah connu sous le nom d'Ibn Almadjdil. — Il s'achève sur le 7e Hâdz ou a exposé des opérations du calcul a l'Ibn Almanil. La copie est datée du 12 Rabîa second de l'an 814 de l'Hégire, ou 26 octobre 1411 de J.-C. — L'achèvement du commentaire du 1 Doubl Indjdah de l'an 811 de l'Hégire, ou 14 août 1411 de J.-C.

Le commentateur Ahmed Ibn Almadjdi mourut en 847 de l'Hégire (23 mars 1443 à 12 mars 1477 de J.-C.), et est mentionné dans le Dictionnaire bibliographique de Hadji Khalfa (nom sous lequel de plusieurs ouvrages concernant l'astronomie et le calcul astronomique. Voir l'édition de Flügel, Tom. I, pag. 310 N° 1126; Tom. II, pag. 681, N° 4990; Tom. III, pag. 118 N° 4111 et pag. 624 N° 7178; Tom. V, pag. 208, N° 10764) Comparer Wœpcke, sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident, pag. 88, lig. 21 et suiv. et Bibl. Bodleiana codd. mss. orientali catalogi partis secundae vol. 1, confecit A. Nicoll. Oxonii, 1821 in folio, pag. 281, N° CCLXXXVI 1°.

Les Numéros des feuillets marqués en marge des pages 1 à 20 de la traduction ci-après se rapportent à la numération écrite au recto et mentionnée ci-dessus.)

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. O Dieu bénis notre seigneur Mohammed, sa famille et ses compagnons, et regarde sur eux ton salut. f. 1 v.

Le pauvre qui a besoin de la miséricorde de son Seigneur, qui confesse son insuffisance dans l'accomplissement de ses devoirs et ses péchés, qui espère le pardon de Dieu qui ressuscite et qui croit, Ahmed le châfeïte Ibn Almadjdi dit :

L'hommage à Dieu qui a reuni (1) les savants dans les habitations (2) de la dignité seigneuriale, et qui a fait tomber (3) sur eux, dans la distribution (4) des qualités excellentes (5), le lot (6) de la bonne fortune, qui a soulevé (7) de leurs

---

(1) Cette préface, écrite en prose rimée est remplie du jeux de mots dans le goût arabe l'auteur ayant eu soin d'employer des mots qui ont en même temps des significations techniques dans l'arithmétique pratique et dans d'autres parties des sciences mathématiques. Ainsi le mot traduit ici par « réunir » signifie en même temps, comme terme technique « additionner »

(2) Ce mot signifie en même temps les « places » ou « rangs » de chiffres dans le numération et en astronomie les « mansions » de la lune

(3) Le mot traduit ici par « faire tomber » signifie aussi « multiplier ».

(4) Ce mot signifie en même temps « division »

(5) Le mot traduit par « qualités excellentes » signifie en même temps « cases » et de là « différence »

(6) Ce mot signifie en même temps « flèche » et « sinus verse » et en outre dans les calculs relatifs aux sociétés du commencants etc. « portions »

(7) Le mot qui signifie « soulever » est souvent aussi employé en arithmétique pratique pour désigner le « nombre » qui « résulte » d'une opération

œuvres le rideau (1), et qui les a comblés de bienfaits innombrables (2), qui leur a fait connaître les essences des noms (3) et les qualités inhérentes et séparables (4), de sorte qu'ils ont découvert les choses inconnues (5), et qu'ils ont appris la signification des mots

Je loue Dieu parce qu'il a revêtu (6) les savants des robes d'honneur de la perfection, et les a ornés des colliers (7) de la gloire Je le remercie de les avoir préservés des deux (espèces d') erreurs (8) dans l'acte d'officier (9) et dans l'action d'écrire, de sorte que les plateaux (10) de leurs balances (11) ont penché en leur faveur

Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu seul, et qu'il n'a point de compagnon, Lui qui est un, unique, simple (12), éternel, inaccessible au nombre, qui n'a point d'épouse (13) ni de fils

Je témoigne que notre seigneur Mohammed est son serviteur et son prophète, son élu et son ami, l'imâm des imâms auquel Dieu a inspiré les paroles de la sagesse, le possesseur de la noble insigne (14) et de la destinée (15) élevée et sublime, de la place (16) qui est l'objet des louanges, et du réservoir (17) du nectar céleste célébré par toutes les langues, qui est initié aux essences et aux détails (18) de la science, et qui juge avec pénétration de l'excellence des offrandes (19), de sorte qu'il confère les grâces, petites et grandes, qui a été transporté dans l'espace de la noblesse aux cercles du plus haut des paradis célestes, dans la main duquel les perles nacrées (20) ont loué Dieu, et qui est l'être par chargé

---

(1) Le soulèvement du rideau a été ici mis à la place du titre d'un célèbre traité d'Ibn Alhaouâ sur l'arithmétique pratique

(2) Textuellement ce qui n'est pas dans le calcul

(3) Ces mots contiennent une allusion évidente aux termes techniques qui désignent les quantités irrationnelles appelées le deux moins et le de plusieurs noms

(4) Altérer à la pureté et retirer et de discrets

(5) Altération de la détermination des erreurs des notaires ou clercs

(6) Le verbe traduit par revêtir est textuellement joindre avec, sans la préposition sur le terme technique qui désigne le soustracteur

(7) Ce mot signifie aussi les nombres, c'est-à-dire les neuf unités, les neuf dizaines [10-80, 100, etc.], les neuf centaines, et ainsi de suite

(8) Allusion aux deux erreurs qui ont lieu dans la règle des deux fausses positions

(9) Allusion à une certaine manière de calculer sur le sable dans laquelle on efface successivement avec le doigt les chiffres que l'on vient d'écrire, pour les remplacer par d'autres jusqu'à ce qu'on arrive au résultat.

(10) Allusion à une autre nom de la règle des deux fausses positions

(11) Le mot qui signifie balance a été pris ici comme terme technique employé pour désigner la preuve, par exemple la preuve par neuf, par sept, etc

(12) Ce mot signifie en même temps impair

(13) Le mot signifie en même temps la racine

(14) Ce mot a plusieurs significations, comme terme technique, le rapport, le deux qui est unité

(15) Le mot signifie en même temps la division

(16) Ce mot a plusieurs significations, comme terme technique, le déterminateur d'une fraction

(17) Ce mot désigne en même temps une certaine partie de la constellation de la Grande Ourse

(18) Textuellement au beaucoup qui est peu

(19) Dans cette phrase le texte du manuscrit paraît être altéré Le mot traduit par offrandes sert à désigner un arithmomètre des calculs d'approximation et en général des procédés expéditifs

(20) Le mot traduit par nacrées désigne en même temps les quantités irrationnelles et, parmi les nombres, ceux qui ne sont premiers entre eux et leur propriété de ne pas se laisser décomposer en facteurs Comparer le *Liber Abbaci* de Léonard de Pise, édition du *Codex Boncompagni*,

Digitized by Google

de la défense de la loi. Puisse Dieu répandre sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons toutes les bénédictions possibles, le salut, la noblesse, l'honneur et la grandeur.

Pour en venir au fait. Attendu qu'aucun blâme (1) ne s'attache à la science du calcul, et qu'elle n'est resserrée par aucune barrière (2), j'ai choisi, dans cette science, comme objet d'une étude particulière, l'ouvrage intitulé « l'Expos. fait » avec choix » (*Talkhîs*), ouvrage complet en fait de théorie, composé par le cheikh, l'imâm, Aboûl Abbâs Ahmed Ibn Albanâ, puisse Dieu couvrir ses péchés de sa miséricorde et le faire demeurer au milieu de son paradis. Cependant j'ai remarqué que cet ouvrage contient des opérations privées de leur partie la plus instructive, en tant qu'elles ne sont pas accompagnées, dans les chapitres qui en traitent, d'un (exemple ou d'un problème) correspondant, et qu'il contient des théories subtiles dont il est impossible d'exposer d'une manière satisfaisante les significations, quand même on y apporterait un soin extrême dans quelques feuillets d'un mince volume, quoique certainement rempli d'une science abondante, si ce n'est que l'auteur n'y a point entrepris l'explication de ces belles opérations. Au contraire, il les a laissées destituées de démonstrations, de sorte que nous ne savons pas si la justesse de ce que l'auteur avance est nécessaire ou accidentelle, et si, en nous conformant à ce qu'il expose, nous pouvons arriver à ce que nous désirons savoir en dehors de cela.

Par conséquent j'ai jugé convenable d'écrire sur cet ouvrage un commentaire qui contînt l'explication des principes sur lesquels il est fondé, l'exposé clair et exact de ses parties compliquées, et qui écartât l'obscurité qui cache (3) les objets qu'il a en vue, de rendre, au moyen de ce commentaire, ce qui se trouve dispersé dans l'ouvrage original, et de rassembler les joyaux précieux qu'il renferme, d'éclaircir enfin les méthodes de ses opérations et les démonstrations de ses problèmes.

J'ai donc essayé (4) mes forces en consignant dans cet ouvrage ce qui est dans les limites du possible, et c'est à l'épreuve (5) que l'on reconnaît la valeur du caillou en qu'on le juge méprisable, j'ai dirigé (6) vers cet objet le cœur (7)

Rome 1857 in-4°, pag. 61, le tableau placé sur la marge de la page. Le mot « hasam » y est la reproduction un peu modifiée du mot arabe qui signifie « mur ».

(1) Littéralement « poussière ». Ce mot technique est en même temps une allusion au calcul du *gobâr* ou calcul de poussière.

(2) Le mot arabe traduit par « barrière » est *hajar* et paraît contenir une allusion à un célèbre traité d'arithmétique, auteur Ibn Albanâ et intitulé « *al-hajâtîyat fi-ghobâr* ».

(3) Littéralement, que cache. Il y a lieu d'écarter la matrice du verbe *kachfun* (*kasafa*). Ces mots renferment peut-être une allusion à un traité du célèbre Nacîr Eddîn Attôsî intitulé *Qachfun* (*kasafa*) *al-qinâ* qui traite d'un sujet appartenant à la trigonométrie sphérique. Voir Hadji Khalfa édition de Flügel Tom. VI pag. 212 et 218, N° 10738. Comparez *ibidem* N° 10742.

(4) Ce mot est employé quelquefois comme expression technique pour désigner l'action de « faire la preuve » d'une opération arithmétique.

(5) Ce mot sert en même temps comme terme technique pour désigner la « vérification » d'une opération arithmétique.

(6) Le mot traduit par « diriger » sert comme terme technique à désigner l'action de « transformer » une fraction donnée dans une autre dont le dénominateur est donné.

(7) Le mot traduit par « cœur » se change par une légère modification des points-voyelles, dans le terme technique qui signifie « zéro ».

de ma pensée en lui donnant du développement (1), et j'y ai mis ma confiance dans le changement (2)

Dieu a eu égard à ma contrition (3), il m'a recompensé en me réconfortant (4), et il m'a aidé à composer, à écrire, et à rédiger cet ouvrage

J'ai intitulé cet ouvrage « Le recueil de la moelle et le commentaire de l'exposé des opérations du calcul »

Dans sa rédaction je me suis fait une loi de commencer (exactement) par mentionner littéralement les paroles de l'auteur, telles qu'il les a consignées dans sa composition. Ensuite je les ai fait suivre d'une explication au moyen d'exemples, et enfin j'ai placé en dernier lieu la démonstration et l'indication des causes, afin que (chaque théorie) soit complète et absolue dans son chapitre et présentée d'une manière claire et spéciale en faveur de ceux qui désireut s'en instruire. J'ai indiqué les paroles de l'auteur au moyen des mots « l'auteur dit telle chose » et au moyen de l'encre rouge, de manière à les distinguer du commentaire et de les mettre à part. Quelque fois aussi j'ai cité des passages de ce que l'auteur a exposé dans (l'ouvrage intitulé) « Le soulèvement du rideau » Dans ces cas je dirai « il a dit », de sorte qu'il n'y a lieu à aucune ambiguïté

de de l. l v. Cependant je n'ai pas vidé la virginité de sa méthode | et je ne me suis pas frauduleusement approprié les choses admirables qui lui appartiennent (3), comme on abuse d'un homme simple, mais j'ai étudié ce que les anciens ont mentionné en fait des principes de cette branche de la science, et ce qu'ils ont expliqué

Il est connu que si l'on ajoute au nombre quelconque
l 47 r au nombre qui le suit, le résultat est le double du premier nombre plus un. Il est connu aussi que l'unité est égale à trois fois un tiers | et que le double d'un nombre quelconque est égal à trois fois deux tiers de ce nombre Par conséquent la somme d'un nombre quelconque et de celui qui le suit est égale à trois fois deux tiers de ce nombre plus un tiers de l'unité (5). Donc, si nous multiplions le double de la somme (7) par le dénominateur des deux nombres, ou a multiplié par le triple de ce qu'il fallait Il est connu aussi, que si l'on

(1) Le mot traduit par « développement » signifie en même temps le « numérateur total » que l'on obtient en réduisant un nombre mixte ou certaines autres espèces compliquées de fractions, en usage chez les Arabes, à une fraction ordinaire

(2) C'est à dire au lieu des vicissitudes des choses humaines. Ce mot paraît contenir une allusion à un terme technique formé de la même racine et qui désigne la « transformation » des équations algébriques

(3) Ce mot signifie, comme terme technique « fraction »

(4) Les deux mots traduits par « récompenser » et « réconforter » désignent en même temps les deux opérations algébriques de la « opposition » et de la « restauration » dont la réunion forme le nom arabe de l'algèbre

(5) Ces mots signifient en même temps : je n'ai rien dérobé à son bien

(6) $v + (v + 1) = 3\left(\frac{2v}{3} + \frac{1}{3}\right)$

(7) C'est à dire $2[1 + 2 + 3 + \ldots + n]$ ou $n(n+1)$

multiplie le double d'un nombre par le triple d'un autre nombre, le résultat est égal à six fois le résultat de la multiplication de l'un des deux nombres par l'autre.

L'auteur dit: *et l'élevation au cube (se fait) par l'élévation au carré de la somme* (1). C'est à dire que le nombre des cubes des nombres suivant leur ordre résulte de la multiplication de la somme des côtés par elle-même. C. 12 v° Fig. 1

La raison de cela, c'est que, si un nombre quelconque est partagé en deux parties, la somme du produit de la multiplication du nombre par l'une de ses deux parties, plus le rectangle des deux parties et le carré de l'autre partie est égale au carré de ce nombre (2).

En effet, le principe de la multiplication d'un nombre par un autre nombre consiste en ce que nous multiplions le tout de l'un des deux nombres par le tout de l'autre. Donc, si l'on divise l'un des deux nombres, ou tous les deux, dans un nombre quelconque de parties, il est nécessaire de multiplier chaque partie de l'un des deux nombres par toutes les parties de l'autre, et d'additionner les résultats. C'est par là aussi que l'on reconnaît la raison de la multiplication suivant les rangs (des chiffres des nombres), parce que chacun des deux nombres multipliés l'un par l'autre peut être décomposé dans ses rangs (2), ainsi que vous le lirez certainement, si Dieu le Très-Haut le permet, dans le chapitre de la multiplication.

Cela étant établi, nous disons que, si un nombre quelconque est divisé en deux parties de quelque manière que ce soit, son carré est égal aux deux carrés de ses deux parties et à leur rectangle pris deux fois.

Soit donc le nombre A divisé en deux parties d'une manière quelconque, et que ce soient B, C. Je dis que le carré de A est égal à la somme des deux carrés de B et C et de leur rectangle pris deux fois.

En effet, A étant divisé en B et C il faut que nous multiplions chacune de ces deux parties par chacune des deux parties de A. Donc posez-les deux fois sur deux rangs, comme il suit

B C
B C

(1) C'est à dire $1^3 + 1^1 + 3^2 + \ldots + n^3 = [1 + 2 + 3 + \ldots + n]^2$

(2) $(a+b)c + ab + b^2 = (a+b)^2$

On trouve un dessin dans la marge du ms. une glose évidemment destinée à remplacer l'alinéa suivant, et dont voici la traduction

J'ai trouvé dans un autre exemplaire, portant l'écriture de l'auteur, une autre explication à savoir la suivante. Exemple. Soit le nombre AB divisé en deux parties au point C, et soit la surface AH le carré de AB. Menons du point C une droite parallèlement à AT ce sera la droite CZ et prenons sur AT un segment égal à AC à savoir AD; enfin menons droite DE parallèlement à AB. Alors, puisque la surface AK résulte de la multiplication de AB par AD, c'est à dire par AC, puisque la surface DZ résulte de la multiplication de DE, c'est à dire de AC, par EZ, c'est à dire par EA, c'est à dire par CB, et puisque la surface EH résulte de la multiplication de EZ par lui même, c'est à dire de DC par lui même, il en suit ce que nous nous étions proposé de démontrer. Cela étant établi, nous disons.



(3) Par exemple 8888 = 8000 + 800 + 80 + 8

Nous multiplions B par B, et ensuite par C, puis C par B, et ensuite par C, et nous additionnons les quatre résultats. Mais le produit de B par B est le carré de B, et pareillement C fois C est le carré de C, et le produit de B fois C et de C fois B est le rectangle B fois B plus deux fois. Par conséquent le carré de A est égal à la somme des carrés de ses deux parties et de leur rectangle plus deux fois.

Il est, par là, évident que le produit de A tout entier par B est égal au carré de B plus le rectangle de B fois C, et que le produit de A tout entier par C est égal au carré de C plus le rectangle de C fois B.

Donc, si l'on multiplie un nombre par l'une de ses deux parties, et que l'on joigne au résultat le carré de la partie qui n'a pas servi à la multiplication, et le rectangle des deux parties, cela est égal au carré du nombre.

Cela étant établi, nous disons qu'il est connu que le cube d'un nombre est le résultat de la multiplication du nombre par son carré. Donc étant donnés des nombres suivant leur ordre et dont le premier soit l'unité, si nous désirons trouver la somme de leurs cubes, vous multiplierez chacun de ces nombres par son carré et vous additionnerez les résultats. Il résultera la quantité cherchée. (1)

Mais le carré d'un nombre quelconque est la somme de son triangle et du triangle du nombre précédent (2), ainsi que nous expliquerons cela certainement ci-après. Et le triangle d'un nombre quelconque est égal à la somme de ce nombre plus le triangle du nombre précédent (3), ainsi qu'il sera pareillement expliqué.

D'après cela, si nous désirons trouver la somme des cubes des nombres suivant leur ordre, et dont le premier soit, par exemple, l'unité, vous multiplierez chacun de ces nombres par son triangle du nombre précédent et vous additionnerez les résultats. Il résultera la quantité cherchée (4).

Soient, par exemple, quatre nombres, dont le premier soit l'unité et le dernier quatre. Nous désirons trouver la somme de leurs cubes. Nous les posons donc dans une ligne, comme ci-après, et au-dessous leurs triangles dans une autre ligne, comme vous le voyez

1	2	3	4
1	3	6	10

Il faut alors que nous multiplions le quatre par le dix qui se trouve au-dessous, et par le six qui est au-dessous du nombre précédent. Puis vous multiplierez le trois

---

(1) $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + (n-1)^3 + n^3 = 1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 3^2 + \dots + (n-1)\cdot(n-1)^2 + n \cdot n^2$

(2) $n^2 = \frac{(n-1)n}{2} + \frac{n(n+1)}{2}$

(3) $\frac{n(n+1)}{2} = n + \frac{(n-1)n}{2}$

(4) $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \dots + (n-1)^3 + n^3 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (1+1) + 3 \cdot (3+3) + \dots + (n-1)\left[\frac{(n-2)(n-1)}{2} + \frac{(n-1)n}{2}\right] + n\left[\frac{(n-1)n}{2} + \frac{n(n+1)}{2}\right]$

par le six, et ensuite par le trois, et pareillement le deux par le trois et ensuite par le un. Puis le un par le un. Vous additionnerez les résultats et il resultera la somme des cubes de ces nombres.

Mais le résultat de l'addition de ces produits est précisement egal au résultat de la multiplication du triangle du plus grand de ces nombres par lui-même, c'est à dire de la somme de ces nombres par elle même (1)

La raison de cela c'est que le triangle du plus grand de ces nombres, à savoir dix, se partage en deux parties, quatre et six, c'est à dire son coté et le triangle precedent. Donc, si vous multipliez le dix par le quatre et le quatre par le six cela revient à former le produit d'un nombre par une de ses deux parties et le rectangle des deux parties. Si donc on ajoute à cela le carré de l'autre partie, il résulte le carre de ce nombre. Mais l'autre partie, c'est six. Et il a été déjà démontré que le carré du six est égal au produit du six par l'une de ses deux parties plus le rectangle de ses deux parties et plus l'autre partie, c'est à dire égal au produit du six par le côté trois, plus le produit du côté trois par le triangle trois qui est le triangle précédent, et en joignant cela encore au carre de l'autre partie, à savoir le trois, parce que le six a été divise en trois et trois. Mais le carré du trois est égal au produit du trois par le côté deux qui est l'une de ses deux parties, plus le rectangle des deux parties, c'est à dire du côté deux multiplié par le triangle un, et plus le carré de l'un. Mais le carré de l'un c'est un.

Il est donc resulta évident, par la, que si l'on multiplie chacun de ces nombres par son triangle et par le triangle du nombre précédent, la somme des résultats est égale au produit de la somme de ces nombres par elle-même et c'est ce que nous avions étions proposé de démontrer (2).

---

(1) $1\ (0+1)+2\ (1+2)+3\ (3+3)+4\ (3+1+3)+\ \ldots\ +$

$+\ (n-1)\left\{\frac{(n-2)\,(n-1)}{2}+\frac{(n-1)n}{2}\right\}+n\left\{\frac{(n-1)n}{2}+\frac{n\,n+1)}{2}\right\}=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=[1+2+1+2+\ \ldots+(n-1)+n]^2$

(2) Cette démonstration d'Ibn Alnadjdjâr exprime de la manière suivante en langage algébrique moderne

$1^3+2^3+3^3+4^3+\ \ldots\ +(n-1)^3+n^3=1\ 1^2+2\ 2^2+3\ 3^2+4\ 4^2+\ \ldots\ +(n-1)\,(n-2)^2+n\ n^2=$

$=1\ (1+1)+2\ (1+2)+3\ (1+3)+4\ (1+3+1)+\ \ldots\ +$

$+\ (n-1)\left\{\frac{(n-2)\,(n-1)}{2}+\frac{(n-1)n}{2}\right\}+n\left\{\frac{(n-1)n}{2}+\frac{n(n+1)}{2}\right\}=$

$=1^2+2\ (1+[2+1])+3\ (3+[3+3])+4\ (6+[4+3])+\ \ldots\ +$

$+\ (n-1)\left\{\frac{(n-2)\,(n-1)}{2}+\left[(n-1+\frac{(n-2)\,(n-1)}{2}\right]\right\}+n\left\{\frac{(n-1)n}{2}+\left[n+\frac{(n-1)n}{2}\right]\right\}$

Mais on a

$1^2+2\ (1+[2+1])=1^2+2\cdot 1+2\cdot[2+1]=(2+1)^2=3^2,$

$3^2+2\ (3+[3+1])=3^2+2\cdot 3+2\cdot[3+3]=(3+3)^2=6^2,$

$3^2+4\ (3+[4+3])=3^2+4\cdot 3+4\cdot[4+3]=(4+3)^2=7^2$

L'auteur dit *Quant à l'addition des nombres impairs suivant l'ordre, elle consiste à élever au carré la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend jointe à l'unité*

Il a été dit précédemment, parmi les propriétés des nombres (naturels) rangés suivant leur ordre, que les unités du plus grand, c'est à dire de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, sont égales au nombre (des termes de la suite). Or, il en seroit de même pour le plus grand des nombres impairs rangés suivant leur ordre, si les nombres pairs étaient intercalés parmi les impairs. Il est connu aussi que le nombre des nombres pairs qui tombent entre ces nombres impairs, est plus petit d'une unité que le nombre des impairs, et si de deux nombres quelconques l'un depasse l'autre d'une unité, leur somme est le double du plus grand moins l'unité, ou le double du plus petit plus l'unité. D'après cela le (nombre) jusqu'auquel (la suite) des impairs s'étend, est le double du nombre de ces impairs moins l'unité.

Il a été déjà rencontré, dans la détermination de la somme de la progression arithmétique, qu'il fallait additionner les deux termes extrêmes et multiplier cela par la moitié du nombre (des termes). Mais (le terme) le plus petit est (ici) l'unité. Lors donc qu'il est ajouté au plus grand, il résulte le double du nombre des nombres. Et il faut que nous multiplions par la moitié du nombre des nombres impairs, c'est à dire par un quart de la somme des deux termes extrêmes. Nous multiplierons donc la somme des deux termes extrêmes par son ijuart. Mais le produit d'un nombre par son quart est egal au produit de sa moitié par sa moitié, ainsi que nous expliquerons cela certainement.

L'auteur dit *Et l'élevation au carré (se fait) par la multiplication d'un sixième de (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'etend, par le rectangle compris sous les deux nombres qui l'avoisinent par après*

Il faut faire précéder ce problème de deux principes.

L'un deux c'est qu'il faut que vous sachiez que la somme des nombres suivant leur ordre depuis l'unité jusqu'au (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, s'appelle le triangle de ce nombre.

$$\left[\frac{(n-1)(n-1)}{2}\right]^2+(n-1)\left\{\frac{(n-2)(n-1)}{2}+\left[(n-1)+\frac{(n-2)(n-1)}{2}\right]\right\}=$$

$$=\left[\frac{(n-2)(n-1)}{2}\right]^2+(n-1)\left[\frac{(n-2)(n-1)}{2}+(n-1)\right]\left[(n-1)+\frac{(n-2)(n-1)}{2}\right]=$$

$$=\left[(n-1)+\frac{(n-2)(n-1)}{2}\right]^2+\left[\frac{(n-1)n}{2}\right]^2$$

$$\left[\frac{(n-1)n}{2}\right]^2+n\left\{\frac{(n-1)n}{2}+\left[n+\frac{(n-1)n}{2}\right]\right\}=\left[\frac{(n-1)n}{2}\right]^2+n\frac{(n-1)n}{2}+n\left[n+\frac{(n-1)n}{2}\right]=$$

$$=\left[n+\frac{(n-1)n}{2}\right]^2+\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

Donc

$$1^3+2^3+3^3+4^3+\ldots+(n-1)^3+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=[1+2+3+4+\ldots+(n-1)+n]^2$$

Soient pris, par exemple, les nombres suivant l'ordre depuis l'unité jusqu'au six, et soient (écrits) au–dessous leurs triangles depuis un jusqu'à vingt et un, et leurs carrés depuis un jusqu'à trente six, ainsi que le montre la figure suivante

1	2	3	4	5	6
1	3	6	10	15	21
1	4	9	16	25	36

Il a été déjà expliqué, dans ce qui précède, que le carré d'un nombre quelconque est égal à son triangle plus le triangle du nombre précédent

En vertu de cela (1) on peut dire que les triangles des nombres pris suivant leur ordre jusqu'à un nombre impair sont égaux aux carrés des nombres impairs suivant l'ordre pris jusqu'au même nombre impair; et que les triangles des nombres suivant l'ordre pris jusqu'à un nombre pair, sont égaux aux carrés des nombres pairs suivant l'ordre pris jusqu'au même nombre pair. Et certainement l'explication de la signification du triangle se présentera lorsqu'il sera question des nombres figurés, si Dieu le Très–Haut le permet

Le second (principe) c'est que tout rectangle formé de deux nombres est égal à ce qui résulte de leur produit lorsque l'un d'eux a été augmenté d'une quantité quelconque tandis que l'autre a été diminué proportionnellement

Pour effectuer l'objet que ce principe a eu vue il y a deux méthodes L'une consiste à diviser l'un des deux facteurs par un certain nombre, et à multiplier l'autre facteur par ce même nombre (2)

(1) On trouve ici sur la marge du ms. une figure dont voici la reduction

Dans un autre exemplaire on lit) En vertu de cela la somme des carrés des nombres depuis le premier jusqu'au nombre des nombres pairs suivant leur ordre est la somme des triangles des nombres suivant leur ordre pris jusqu'à un nombre déterminé sur le carré de l'unité est égal à son triangle parce qu'il n'est précédé de rien et le carré le trois est égal à son triangle plus le triangle du nombre pair précédent et pareillement le carré de deux est égal à son triangle plus le triangle du nombre impair précédent Et ainsi de suite d'après le même ordre Et certainement la signification du triangle sera expliquée lorsqu'il sera question des nombres figurés si Dieu le Très–Haut le permet

Le second principe c'est que tout rectangle formé de deux nombres est égal à ce qui résulte de leur produit lorsque l'un d'eux a été augmenté d'une quantité quelconque tandis que l'autre a été diminué proportionnellement



Exemple Soit le rectangle AD formé par le produit de AB fois AC, et soit ensuite AC divisé en point E Que l'on prenne sur AE de BZ et soit CF = EA comme BZ = AE, c'est à dire la partie manquante à un pour reste comme la partie opposée à un sur la ligne à laquelle elle est ajoutée; enfin complétons le rectangle AT de la sorte les deux rectangles AD AT sont égaux La raison de cela c'est que CB est = EA; c'est à dire DH = HB, comme BZ = AH, c'est à dire comme HT = HE Or le rectangle ED est formé du produit de la première par la quatrième (grandeur) qui sont DH HA et le rectangle BT est formé du produit du second par la troisième puisque tout HB HT sont toujours les deux rectangles ED BT sont deux égaux ce qui a été démontré précédemment Ajoutons le rectangle HI commun partie commune à chacun des deux rectangles Alors les deux rectangles AD, AT seront égaux Et c'est ce que nous nous étions proposé de démontrer

(2) $a \cdot b = \left(\frac{a}{m}\right) \cdot (b \cdot m)$

L'autre méthode consiste à retrancher de l'un des deux facteurs une quantité arbitraire, à prendre le rapport de la partie retranchée à la partie restante et à ajouter à l'autre facteur une quantité proportionnelle à ce rapport (1).

Exemple soit l'un des deux facteurs six et l'autre huit. Ce qui résulte de la multiplication de l'un par l'autre est quarante huit. Or, si vous divisez le six, par exemple par deux, il résulte trois, et si vous multipliez le huit par
f. 18 r. le deux, il résulte seize. Alors ce qui résulte | de (la multiplication) de trois par seize est quarante huit.

Et si vous retranchez du six par exemple trois, le rapport de cela au reste, à savoir à trois, est celui de l'égalité, ajoutant par conséquent au huit son équivalent il résulte seize. Alors le résultat de la multiplication de trois par seize est quarante huit, comme d'abord.

Et si vous retranchez du six deux, le rapport de cela au reste, à savoir au quatre, est la moitié, ajoutant donc au huit l'équivalent de sa moitié, il résulte douze. Alors le résultat de la multiplication de quatre par douze est pareillement quarante huit.

La cause de cela est

Mais il a été déjà expliqué, dans le second principe, que tout rectangle locume de deux nombres est égal à ce qui résulte de (la multiplication de) ces deux nombres lorsque l'un d'eux a été augmenté d'une certaine quantité, tandis qu'elle a été retranchée de l'autre proportionnellement, non suivant sa grandeur absolue. Par conséquent un tiers du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, et la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend étant les deux côtés d'un rectangle, si l'on augmente le premier de deux fois sa propre valeur, de sorte que l'on obtient le troisième (nombre) |
f. 18 v. à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, exactement, et si l'on diminue l'autre suivant la même proportion, de sorte qu'il est réduit à un sixième du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, parce que le tiers est un tout comme le sixième à la moitié, alors on est ramené à trois côtés dont l'un est le troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, l'autre le second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, et le dernier un sixième du (nombre) jusqu'auquel la suite s'étend. On multiplie donc le premier par le second, et ce qui résulte par le troisième

f. 19 r. lig. 3 L'auteur dit : *Et l'élévation au cube (se fait) par la multiplication de la somme par son double moins un* (2). L'explication de ce problème est conforme à l'explication de l'addition des cubes des nombres pairs suivant leur ordre. Nous la différerons donc jusque là, et par la sera expliqué ce qui vient
f. 19 r. lig. 4. d'être mentionné.

(1) Si bien que $\frac{m}{n-m} = \frac{n}{b}$, on aura $n \ldots b = (n-m)b + nb$

(2) C'est à dire $1^3 + 3^3 + 5^3 + \ldots + (2l-1)^3 = n^2(2n^2-1)$

L'auteur dit : *Quant à l'addition des nombres pairs suivant l'ordre, elle consiste à ajouter au (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'etend, constamment deux, et à multipher la moitié de la somme par la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'etend.*

Attendu que le nombre des nombres (naturels) suivant l'ordre est égal au (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, mais que, entre les nombres pairs pris suivant l'ordre, manquent les impairs pris suivant l'ordre, dont le nombre est égal au nombre des pairs, parce que le premier des pairs est deux qui est précédé par l'unité, il s'ensuit que, dans les nombres pairs le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est egal au double du nombre (des nombres). L'addition des deux termes extrêmes consiste donc à ajouter au (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend deux, parce que c'est le premier des pairs. Par conséquent on multiplie deux plus le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'etend, à savoir la somme des deux termes extrêmes par la moitié du nombre des pairs, c'est à dire par un quart du double de ce nombre, ou par un quart du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend. Mais le produit des deux termes extrêmes par un quart du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'etend est egal au produit de la moitié de la somme des deux termes extrêmes par la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, ce vertu de ce qui a été expliqué dans le second principe. Dieu seul connait la vérité

L'auteur dit : *Et l'élévation au carré (se fait) par la multiplication de deux tiers du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, plus deux tiers de l'unité, par la somme (des nombres pairs simples), ou par la multiplication d'un sixième du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, par le rectangle compris sous les deux nombres qui l'avoisinent par après*

L'auteur mentionne ici deux méthodes pour trouver (la somme) des carrés des nombres pairs. La seconde est celle qui a été donnée déja precédemment pour trouver (la somme) des carrés des nombres impairs. En effet, il a été expliqué, à l'occasion du premier principe, que les carrés des nombres impairs ou des nombres pairs (additionnés) suivent leur ordre sont egaux aux triangles des nombres (naturels additionnés) suivant leur ordre jusqu'au même nombre impair ou (jusqu'au même nombre) pair, et que, si ces triangles sont divisés par la somme de leurs côtés, il resulte des (quotients) qui se dépassent mutuellement d'un tiers (1). L'opération revient donc à ceci, que la quantité cherchée soit decomposée en trois côtés, à savoir la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, le second (nombre) à partir de ce (nombre) et un tiers du troisième (nombre) à partir de ce (même nombre), ainsi que tout cela a été expliqué à

(1) Cest à dire

$$\frac{1+6+15+\ldots+\frac{(n-1)n}{2}+\frac{n(n+1)}{2}}{1+6+13+\ldots+(n-1)+n}\cdot\frac{1+3+6+\ldots+\frac{(n-1)n}{2}}{1+6+11+\ldots+(n-1)}=\frac{1}{3}$$

l'occasion des carrés des nombres impairs. Il n'y a, à cet égard, aucune différence entre la sommation des impairs et des pairs. Enfin le produit de la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend par un tiers du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, est égal au produit du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, tout entier, par un sixième du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend. Or cela, c'est exactement la méthode pour l'addition des carrés des nombres impairs.

Quant à la première méthode, elle consiste à multiplier un tiers du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend plus deux tiers de l'unité par la somme, c'est à dire par la somme des nombres pairs pris suivant l'ordre. Il a été déjà expliqué, dans ce qui précède, que, si on multiplie les uns par les autres les trois entiers, à savoir la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, le second (nombre) à partir de ce (nombre) et un tiers du troisième (nombre) à partir de ce (même nombre), il résulte la quantité cherchée ainsi qu'il a été dit. Mais le produit du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend par un tiers du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, est égal au produit du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, par un tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, en vertu de ce que vous savez. Si ensuite ce qui résulte (est multiplié) par la moitié du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, il résulte la même chose que d'abord. Mais si vous multipliez le troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend par deux tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, alors il faudra multiplier le résultat par un quart du nombre (1) (le produit qu'il s'agit de former) est donc décomposé dans le produit du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, fois deux tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, ce qui résulte (devant être multiplié) par un quart du nombre. Mais un quart du nombre des nombres (naturels) suivant leur ordre est égal à la moitié du nombre des nombres pairs suivant leur ordre, car il manque au nombre (des nombres naturels) des nombres impairs en quantité égale à ces nombres pairs, ainsi qu'il a été dit. La quantité cherchée est donc un rectangle (2) (formé) de trois côtés dont l'un est le troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, l'autre deux tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend, et le dernier la moitié du nombre des nombres pairs pris suivant l'ordre. Or, par quelque de ces trois côtés | que vous commenciez, c'est permis. Multipliez donr, par exemple le troi- | 89r
sième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend par la moitié du nombre des nombres pairs, et que ce qui résulte soit multiplié par deux

(1) $[2n+2]\ \frac{2n+1}{6}\ \frac{2n}{6} = (2n+2)\frac{n}{3}(2n+1)\frac{2n}{4}$

(2) Sic. On se serait attendu à ce que l'auteur dît « un solide ».

tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend (1). Mais le troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend dépasse celui jusqu'auquel (la suite) s'étend constamment de deux. Lors donc que nous multiplions ce nombre par la moitié du nombre (des nombres pairs) c'est comme si nous avions additionné les deux termes extrêmes et que nous eussions multiplié la somme par la moitié du nombre (des nombres pairs). Mais il a été déjà expliqué que le résultat de la multiplication de la somme des deux termes extrêmes par la moitié du nombre (des nombres) est la somme de ces nombres. D'après cela le résultat de la multiplication du troisième (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend par le moitié du nombre (des nombres) sera la somme des nombres pairs suivant l'ordre. On est donc ramené à la multiplication de cette somme par deux tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend (2). Mais deux tiers du second (nombre) à partir de celui jusqu'auquel (la suite) s'étend sont deux tiers du (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend plus deux tiers de l'unité, attendu que les nombres (naturels) suivant leur ordre se dépassent mutuellement d'une unité, et que, par conséquent, leurs parties se dépassent mutuellement des parties (correspondantes) de l'(unité), ce qui est évident. L'opération revient donc à la multiplication de deux tiers du nombre jusqu'auquel (la suite) s'étend plus deux tiers de l'unité par la somme (des nombres pairs simples) (3), ainsi qu'il a été mentionné. Dieu seul connaît la vérité.

L'auteur dit : *Et l'élévation au cube (se fait) par la multiplication de la somme (des nombres pairs simples) par son double* (4). (f. 39) lig. 2

Pour la démonstration de ce (théorème) établissons préalablement deux propositions.

L'une d'elles c'est que la somme des nombres (naturels), depuis l'unité, suivant leur ordre, est la moitié de la somme des nombres pairs pris à partir du deux suivant leur ordre, et égaux en nombre aux (nombres naturels) (5). Soient, par exemple, quatre nombres (naturels) suivant l'ordre, dont le premier soit l'unité et le dernier quatre, leur somme sera dix. Et soient quatre autres nombres pairs, dont le premier soit deux et le dernier huit, leur somme sera vingt. Or, chacun des nombres pairs étant le double de celui qui lui correspond

---

(1) $(2n+2)\ \frac{2}{3}(2n+1)\ \frac{2n}{4} = (2n+2)\ \frac{n}{2}\ \frac{2}{3}(2n+1)$

(2) $(2n+2)\ \frac{n}{2}\ \frac{2}{3}(2n+1) = [2+4+2+\ldots+2n]\ \frac{2}{3}(2n+1)$

(3) $[2+4+6+\ldots+2n]\ \frac{2}{3}(2n+1) = \left[\frac{n}{3}(2n+\frac{3}{3})\right] = [2+4+6+\ldots+2n]$.

(4) $2^3+4^3+6^3+\ldots+(2n)^3 = 2[2+4+6+\ldots+2n]^2$

(5) $1+2+3+\ldots+n = \frac{1}{2}[2+4+2+\ldots+2n]$

parmi les nombres (naturels, pris) suivant leur ordre, ou des nombres (naturels) est au (nombre pair) correspondant comme la somme des uns à la somme des autres suivant l'ordre. Cela est évident, en vertu de ce qui a été établi précédemment.

La seconde (proposition), c'est que le cube d'un nombre quelconque est égal à huit fois le cube de la moitié de ce même nombre (1).

Exemple. Soit A un nombre donné (2), qu'il soit divisé en deux parties égales, que l'une des deux parties soit B, et qu'il s'agisse d'élever A au carré, c'est-à-dire de le multiplier par lui-même. Or, par sa division, chacun des deux facteurs a été partagé en deux segments, et tous ces segments sont égaux entre eux et égaux à la quantité B. Par conséquent la multiplication de A tout entier par lui-même est égale à la multiplication de chaque segment de l'un des deux facteurs par les deux segments de l'autre, accompagnée de l'addition des quatre résultats qui sont tous des carrés égaux, et dont chacun est égal au carré de B. Mais ces quatre carrés forment le carré de A; d'où il suit que le carré d'un nombre quelconque est égal à quatre fois le carré de sa moitié. En même temps il est connu que le cube d'un nombre quelconque est ce qui résulte de la multiplication de ce nombre par son carré. Mais la multiplication de A tout entier par son carré tout entier, est égale à la multiplication de chacune de ses deux moitiés par les quatre parties de son carré, et de la multiplication d'une de ses moitiés par les quatre parties de son carré, dont chacune est égale au carré de B, il résulte quatre cubes, de sorte que l'ensemble de ces cubes est égal à huit fois le cube de la moitié de [A], et que chacun de ces cubes est égal au huitième du cube de ce nombre (A). Par conséquent le cube de la moitié d'un nombre quelconque est égale au huitième du cube de ce nombre. C'est ce que nous nous étions proposé d'établir préalablement.

D'après cela, si nous voulons additionner les cubes des nombres pairs suivant l'ordre, et dont le premier soit deux, et si nous considérons ces nombres pairs comme s'ils étaient des nombres (naturels) suivant l'ordre, et dont le premier soit l'unité, alors la somme des cubes de ces derniers sera un huitième (de la somme) des cubes qu'il s'agit de trouver. Mais il a été expliqué, dans ce qui précède sur la sommation des cubes des nombres (naturels) suivant leur ordre, que, si l'on multiplie la somme de ces nombres par elle-même, il résulte la quantité cherchée. Donc vous multiplierez la somme des nombres (naturels) suivant leur ordre par elle-même et le résultat pris huit, afin qu'il résulte la quantité (actuellement) cherchée. Mais le produit d'un nombre par lui-même et

(1) $a^3 = x \left(\frac{a}{2}\right)^3$

(2) Dans ce qui suit le texte du manuscrit arabe présente un certain nombre d'erreurs qui proviennent évidemment de ce que le copiste ne comprenait pas bien ce qu'il écrivait. Mais il est trop facile de reconnaître ces méprises et de les corriger pour qu'il vaille la peine de les signaler et de les relever une à une.

Digitized by Google

du résultat par huit est égal au produit du même nombre par son double et du résultat par quatre, qui égal au produit du double de ce même nombre par lui-même et du résultat par deux. En même temps il a été déjà expliqué que la somme des nombres pairs à partir du deux suivant l'unité est le double de la somme des nombres (naturels correspondants) à partir de l'unité suivant l'ordre. En outre le produit de la somme des nombres pairs par elle même et du résultat par deux est égal au produit du même nombre par son double. Par conséquent le résultat de la multiplication de la somme des nombres pairs par son double est la somme de leurs cubes, et c'est ce que nous nous étions proposé de démontrer.

Ayant ainsi expliqué la raison de la sommation des cubes des nombres pairs, mentionnons maintenant l'explication de la raison de la sommation des cubes des nombres impairs.

Cela s'expliquera au moyen de ce qui précède, quand nous aurons établi encore deux autres principes, dont l'un est que le produit du plus grand de deux nombres différents quelconques par son double est égal au produit de ce (nombre) par leur somme plus le produit du même par leur différence, et que le produit du plus petit par son double est égal au produit de ce (nombre) par leur somme moins son produit par leur différence (et car il est évident que le plus grand des deux nombres est exactement égal au plus petit plus leur différence, et que le plus petit des deux nombres est égal au plus grand moins leur différence. Il suit donc nécessairement que le double du plus grand est égal à leur somme plus leur différence, et que le double du plus petit est égal à leur somme moins leur différence.

Le second (principe) est que, si dans (une suite) de nombres (naturels) quelconques (pris) suivant l'ordre à partir de l'unité, le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est pair, la somme des nombres pairs compris dans (cette suite) dépasse la somme des nombres impairs y compris de la quantité du nombre impairs, et si le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est impair, la somme des nombres pairs est inférieure à la somme des nombres impairs de la quantité des nombres impairs.

En effet, si le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est pair, le nombre des nombres (naturels) suivent l'ordre se partage en deux moitiés égaux dont l'un est le nombre des nombres pairs compris dans (la suite) et l'autre celui des nombres impairs y compris. Mais le premier des nombres pairs, à savoir deux, dépasse le premier des nombres impairs d'une unité, et pareillement le second (nombre pair), à savoir quatre, dépasse le second des nombres impairs d'une unité, et ainsi de suite jusqu'au dernier. La somme des nombres pairs dépasse donc la somme des nombres impairs d'une quantité égale à leur nombre. Si le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est impair, le nombre des

(1) $a \cdot 2a = a(a+b) + a(a-b)$, $b \cdot 2b = b(a+b) - b(a-b)$.

nombres (naturels) suivant leur ordre se partage en deux nombres différents dont l'un, qui est le nombre des nombres impairs, dépasse l'autre d'une unité. Mais le premier des nombres impairs, à savoir l'unité n'est précédé de rien; le second des nombres impairs dépasse le premier des nombres pairs de l'unité, et ainsi de suite jusqu'à ce que le dernier des nombres impairs, à savoir le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, dépasse le dernier des nombres pairs d'une unité. La somme des nombres impairs dépasse donc la somme des nombres pairs d'une quantité égale au nombre des nombres impairs.

Ceci étant établi, nous disons qu'il est évident que, si de la somme des cubes des nombres (naturels) suivant leur ordre, pris à partir de l'unité, on retranche la somme des cubes des nombres pairs y compris, il reste la somme des cubes des nombres impairs y compris. Or, il a été déjà expliqué que la somme des cubes des nombres (naturels) suivant leur ordre résulte de l'élévation au carré de la somme de ces nombres (1). Mais la somme de ces nombres est composée de deux sommes, c'est à dire de la somme des nombres pairs et de la somme des nombres impairs. Par conséquent son carré s'obtient par la mul-

---

(1) Pour faire mieux voir la suite des raisonnements qui forment la démonstration d'Ibn Almadjdi, désignons par S_n la somme d'une suite de nombres naturels par S_1 la somme de 1 par n, le nombre des nombres impairs compris dans la suite par S_p la somme des nombres pairs compris dans la suite de sorte que $S_1 + S_p = S_n$, dès-lors on aura par S_{n^2} la somme des cubes des mêmes nombres naturels, par S_{n^3} la somme des cubes des mêmes nombres impairs, et par S_{n^3} la somme des cubes des mêmes nombres pairs, de sorte que $S_{n^3} + S_{n^3} = S_{n^2}$.

Cela posé soit premièrement le dernier terme de la suite un nombre pair de sorte que $S_n > S_1$ l'on aura

$$S_{n^2} = S_n^2 = (S_p + S_1)^2 = S_p(S_p + S_1) + S_1(S_p + S_1),$$
$$S_{n^3} = S_p - 2S_p = S_p(S_p + S_1) + S_p(S_p - S_1),$$

dont

$$S_{n^3} = S_{n^2} - S_{n^3} = S_1(S_p + S_1) - S_p(S_p - S_1) =$$
$$= S_1(S_p + S_1) - S_1(S_p - S_1) - (S_p - S_1)^2 -$$
$$= S_1 + 2S_1 - (S_p - S_1)^2 = S_1 \quad 2S_1 - y^2 = S_1 \; 2S_1 - S_1 =$$
$$= S_1(2S_1 - 1)$$

Secondement soit le dernier terme de la suite un nombre pair S_1 de sorte que $S_1 > S_n$ l'on aura

$$S_{n^2} = S_n^2 = S_p(S_1 + S_p) + S_1(S_1 + S_p)$$
$$S_{n^3} = S_p \quad 2S_p = S_p(S_1 + S_p) - S_p(S_1 - S_p)$$
$$S_{n^3} = S_1(S_1 + S_p) + S_p(S_1 - S_p) =$$
$$= S_1 - 2S_1 - S_1(S - S_p) + S_p(S_1 - S_p) =$$
$$= S_1 \quad 2S - S_1(S_1 - S_p) - (S_1 - S_p)^2 + S_p(S_1 - S_p) =$$
$$= S_1 + 2S_1 - (S_1 - S_p)^2 = S_1 \quad 2S - S_1 =$$
$$= S_1(2S_1 - 1)$$

Digitized by Google

tiplication de chacun des deux sommes par leur somme. Montenrut, si la somme des cubes des nombres pairs résoltait de la multiplication de la somme des nombres pairs par la somme des deux sommes, la somme des cubes des nombres impairs resultrait nécessairement de la multiplication de la somme des nombres impairs par la somme des deux sommes. Mais il a été expliqué que la somme des cubes des nombres pairs résulte de la multiplication de la somme des nombres pairs par son double. En outre si le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est pair, il est évident que le produit de la somme des nombres pairs, qui est le plus grand des deux nombres, par son double est égal à son produit par la somme des deux sommes plus son produit par leur différence. D'après cela la somme des cubes des nombres impairs résulte du produit de la somme des nombres impairs par la somme des deux sommes moins le produit de la somme des nombres pairs, par leur différence. En même temps il a été expliqué que le plus grand de deux nombres se divise dans le plus petit et la différence. Le produit de la différence par le plus grand est donc égal à son produit par le plus petit plus son produit par elle-même, c'est à dire plus son carré. Par suite de cela la somme des cubes des nombres impairs résulte du produit de la somme des nombres impairs par la somme des deux sommes moins son produit par leur différence et moins le carré de la différence. Mais il a été expliqué que le produit du plus petit de deux nombres par leur somme moins son produit par leur différence est exactement égal à son produit par son double. D'après cela la somme des cubes des nombres impairs résulte du produit de la somme des nombres impairs par son double moins le carré de la différence. Mais il a été déjà expliqué que la différence est égale au nombre des nombres impairs, et il a été expliqué en même temps, dans ce qui precede, que la somme des nombres impairs résulte de l'élévation au carré de leur nombre. | 1 21 r
Il suit donc nécessairement que le carré de la différence est la somme des nombres impairs. Mais le produit de la somme des nombres impairs par son double, si l'on retranche resultr du résultat la somme des nombres impairs, est exactement egal au produit de la somme des nombres impairs par son double moins un, attendu que le principe de la multiplication consiste à prendre l'un des deux nombres autant de fois qu'il est contenu d'unités dans l'autre.

Si le (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend est impair, le plus petit des deux nombres est la somme des nombres pairs et le plus grand la somme des nombres impairs, ainsi qu'il a été expliqué, et le produit du plus petit des deux nombres par son double est égal à son produit par la somme des deux nombres moins son produit par leur différence. Par suite de cela la somme des cubes des nombres impairs résulte alors du produit de la somme des nombres impairs par la somme des deux sommes plus le produit de la somme des nombres pairs par leur différence, ce qui est le produit du plus grand des deux nombres par leur somme plus le produit du plus petit par leur différence. Or, il a été déjà expliqué que le produit de plus grand de deux nombres par son dou-

lle est égal à son produit par leur somme plus son produit par leur différence. Mais il a été déjà expliqué, (ro outre,) que le produit du plus grand par la différence est egal au produit du plus petit par la différence plus le carre de la différence D'apres cela le produit du plus grand par son double est égal a son produit par leur somme plus le produit du plus petit par la différence et plus le carré de la différence En meme temps il a été expliqué que la somme des cubes des nombres impairs résulte du produit du plus grand par la somme plus le produit du plus petit par la différence Il s'ensuit donc nécessairement que le produit de la somme des nombres impairs par son double dépasse la somme de leurs cubes du carré de la différence Mais il a été expliqué que le carré de la différence est exactement égal à la somme des nombres impairs Par conséquent il résulte du produit de la somme des nombres impairs par son double diminué constamment de l'unité, la somme de leurs cubes Et c'est ce que nous nous étions proposé de démontrer

1 fil. - lig. 12. Il a dit (1) Lorsque le commencement se fait à partir (d'un nombre) différent de l'unité, vous déterminerez le nombre des nombres, ainsi qu'il a été exposé précédemment, puis la somme ou (le résultat de) l'addition à partir de l'unité jusqu'au (nombre) jusqu'auquel (la suite) s'étend, et ensuite à partir de l'unité jusqu'au nombre qui precede le commencement, et vous retrancherez le plus petit du plus grand. Le deux tient, pour les nombres pairs, la place de l'unité On opère d'après cette seconde manière dans la sommation des carrés et des cubes se suivant d'après l'ordre à partir (d'un nombre) différent de l'unité. Sachez-le donc

Attendu que les méthodes produites et mentionnées (dans ce qui précede) pour l'addition des nombres (naturels) suivant leur ordre, et pareillement des nombres impairs et des nombres pairs, sont fondées sur la condition de commencer par l'unité dans les deux premiers cas, et par le deux dans le troisième, ainsi qu'il a été dit dans ce qui precede, elles ne s'appliquent pas aux cas où le commencement se fait à partir (d'un nombre) différent de celui exigé par la dite condition. A cause de cela on opère alors d'après la méthode ordinaire, à savoir celle qui a été déja expliquée a l'occasion de la neuvième des questions composées, c'est à dire du cas ou l'on ignore le nombre (des termes de la suite) en même temps que la somme. Cette méthode consiste, pour trouver le nombre (des termes), en ce que vous divisez la différence des deux termes extrêmes par la quantité dont (les termes) se dépassent mutuellement, d'où il resultera le nombre (des termes) moins un. Ensuite vous multiplierez la somme des deux termes extrêmes par la moitié du nombre (des termes) d'où il resultera la somme. Ou bien (on opère alors) d'après la seconde manière, ainsi qu'il vient d'être dit, parce que, si quelqu'un dit: additionnez les nombres impairs

(1) Ces mots indiquent que ce qui suit est extrait de l'ouvrage d'Ibn Albanâ auquel Ibn Almadjdi en a prévenu le lecteur dans sa préface. Voir ci-dessus, pag. 4 lig. 14 à 17.

suivant leur ordre, par exemple depuis sept jusqu'à quinze, c'est comme s'il avait dit : additionnez les nombres impairs suivant leur ordre depuis l'unité jusqu'à quinze moins la somme des nombres impairs depuis l'unité jusqu'à six. Par la est expliqué aussi le reste des cas, parce que le principe est le même.

On comprend, d'après ce qui précède, que la première manière est plus particulière que la seconde, attendu qu'elle a pour condition l'existence de la proportion arithmétique, de sorte qu'elle ne comprend pas les (cas des) carrés et des cubes.

La phrase de l'auteur « Le deux tient, pour les nombres pairs, la place de l'unité », signifie que, si les nombres pairs (pris) suivant leur ordre, et leurs carrés et leurs cubes, commencent par le deux, on opère d'après la méthode particulière précédemment mentionnée, que, si (la suite ne commence) pas (par le deux), on opère d'après les deux manières qui viennent d'être mentionnées, pourvu que la chose demandée soit seulement d'additionner les nombres pairs (simples), sinon, on emploie, pour leurs carrés et leurs cubes, la seconde manière exclusivement. f. 21 r° lig. 22

Quant à la manière de trouver les côtés rationnels des cubes, et les côtés d'autres (puissances), et à ce qui s'y rattache, nous mentionnerons cela certainement dans le chapitre des racines, si Dieu, le Très-Haut, le permet.

Il a dit : « L'exposé (des propriétés) des carrés est fondé sur (celles) des triangles, et pareillement (la théorie) des pentagones et des autres nombres figurés. Expliquons donc cela, et expliquons la manière de les trouver, ainsi que l'opération (dont on se sert) dans ce (but) et dans leur addition. » Tout cela est compris dans l'opération mentionnée dans le Traité. Je dis donc que les Arithméticiens placent les nombres suivant leur ordre dans une ligne, et les appellent « côtés », en les assimilant aux lignes, qu'ils considèrent l'unité comme contenant virtuellement toutes les figures, de sorte qu'elle est cote, triangle, carré, et chacune des autres figures virtuellement, qu'ils additionnent l'unité, comme triangle, au deux comme côté, d'où résulte le second triangle, et qu'ils additionnent ensuite celui-ci au trois, comme côté, d'où résulte le troisième triangle, etc. f. 21 v

(1) Puisque donc nous avons obtenu comme résultat ces quantités composées, multiplions le cube-cube par un. Il en résultera (le cube-cube) lui-même, et nous le posons dans une première ligne. Ensuite nous multiplions le quadrato-cube par dix, et nous posons le résultat dans une seconde

(1) Pour l'intelligence de ce qui suit je ferai observer qu'il s'agit ici de vérifier l'équation

$$x^3 + 10x^2 + 640000\,x^3 + 16660480\,x^2 = 481\,x^3 + 6400\,x^2 + 13100\,x^2,$$

et que l'on a

$x = 10$	$x^3 = 65536$
$x^2 = 650$	$x^5 = 1048576$
$x^3 = 4096$	$x^6 = 16777216$

ligne. Après cela nous multiplions le coté, c'est à dire le seize, par le coefficient des cubes, et nous posons cela dans une troisième ligne. Enfin nous plaçons le coefficient du carré dans une quatrième ligne. Nous additionnons les quatre lignes, d'où il provient ce qui se trouve au-dessus du trait, et cela est le résultat du premier membre de l'équation.

Ensuite nous multiplions le carré-carré par le coefficient du cube-cube, et
f. 202v. nous posons cela dans une première ligne. Nous multiplions le cube par le coefficient du quadrato-cube et nous posons cela dans une seconde ligne. Puis nous multiplions le carré par le coefficient du carré-carre, et nous posons cela dans une troisième ligne. Nous additionnons ces trois lignes, et il résulte ce qui se trouve au-dessus du trait. Cela est le resultat du second membre de l'équation, et est conforme au premier.

		80203270
le premier résultat	premier	10777840
	second	10485700
	troisième	10308000
	quatrième	10000400

		80803370
le second résultat	premier	30180000
	second	02120400
	troisième	03002000

Il est évident par là que la différence entre les deux parties est deux carrés moins dix, et nou dix moins deux carrés, si par hasard vous aviez d'abord supposé cette différence égale a dix moins deux carrés.

Vous êtes arrivé, dans cet exemple, a ce qui a été expliqué précédemment, a savoir que l'on ne doit pas affirmer qu'une solution ne peut pas être juste, a moins d'avoir passé, pour les deux resultats opposés qui resultent de l'augmentation après la diminution, d'un nombre au nombre immédiatement suivant. Alors la justesse sera déterminée dans cette dernière forme. Conduisez donc l'operation dans ce cas conformément a ses conditions, et vous opérerez juste, si Dieu, le Très-Haut, le permet.

J'ai proposé tous les problèmes de cette section comme des (cas particuliers) dérivés d'un seul (probleme) fondamental, afin de rendre évident par là que de tous les problèmes précédemment mentionnés il peut être déduit une infinite (de cas particuliers).

Que ceci soit la fin de ce que nous avons présenté dans cette composition. Louange Dieu seul connaît la vérité.

L'achèvement de cet (ouvrage) eut lieu a l'aube du jour béni de mercredi, le sixième (jour) du mois sacré de Dzoûl-hidjdjah de l'année huit cent trente quatre (1), par la main de celui qui a besoin du Dieu Très-Haut, qui l'a écrit et composé, Ahmed Ibn Ahmadjdi le chaféite, puisse Dieu pardonner a lui, à ses père et mère, et a tous les musulmans, amen, amen. Que la bénédiction et

(1) Cette date correspond au mercredi 18 août 1431 de J.-C.

le salut de Dieu soient sur la plus noble de ses créatures, Mohammed, et sur sa famille

Ceci est la fin de ce que j'ai trouvé dans l exemplaire de mon seigneur, qui fut écrit de sa main, puisse Dieu le Très-Haut prolonger sa vie, sur lequel (exemplaire) j'ai copié le présent exemplaire L'achèvement de la copie du présent exemplaire eut lieu vers midi, le lundi, dix-septième (jour) du mois de Rabia second de l'année huit cent quarante (1). Et cette copie fut faite pour son propre usage, et pour l' usage de qui il plaira à Dieu après lui, par l'esclave qui a besoin de la miséricorde de son maître le riche et l'éternel, Abûl Bacqât Mohammed Ben Mohammed Ben Mohammed Al'irâki, puisse Dieu pardonner à lui, à ses père et mère, aux docteurs (qui l'ont instruit), et à chacun de tous les musulmans, amen. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur notre seigneur Mohammed, sa famille et ses compagnons. Dieu nous suffit, c'est le meilleur des protecteurs

(1) Le Catalogue des Mss. orientaux du British-Museum donne ici comme date du mss. dans le texte qu'il reproduit le vingt septième et dans la traduction latine dont il accompagne ce texte, le vingt-sixième. L'un et l autre est erroné. Le Ms. porte en réalité le dix-septième, et ce qui prouve en outre que cette leçon est la bonne c'est que le jour dont il s agit doit être en Lundi (feria secunda), ce qui a lieu en effet pour le 17 Rabia II de l année 840 de l'hégire qui correspond au lundi 28 octobre 1436 de J. C., tandis que le 27 Rabia II de l année 840 de l'hégire est un Jeudi

Manuscrit coté CCCCXIX des manuscrits orientaux du British Museum (7470 des manuscrits additionnels)

(Volume in 4° de 114 feuillets en papier, dont les deux premiers, et les deux derniers sont des feuillets de garde non numérotés. Les 110 autres feuillets sont numérotés aux rectos avec les numéros 1 à 110 écrits au crayon en chiffres modernes, et aux versos avec les numéros 1 à 100 et 1 à 10 écrits à l'encre en chiffres arabes orientaux

Ce manuscrit est occupé depuis fol. 1 du verso du feuillet numéroté 0 jusqu'au fol. 110 du recto du feuillet numéroté 110, par le corps d'un Traité intitulé « La clé du calcul » par Djemchid Ben Mas'oûd Ben Mahmoûd le médecin surnommé Ghyâth (Eddîn) Alqâchâni La copie est datée du lundi, 12 Chawwâl de l'année 891 de l'hégire ou probablement 11 août (11 1119 de J. C.

Le verso du feuillet numéroté 1, et le recto et verso du feuillet numéroté 2 sont occupés par un premier projet de la préface qui ne diffère de la rédaction qui occupe le verso du feuillet numéroté 1, le parfeuil suivant ou recto qu'il renferme une rédaction adressée au célèbre Sultan de Samarkand Ooloug Beg Gourgân, et une table très détaillée des contenus des chapitres de l'ouvrage entier

L'auteur fut un des astronomes qui prirent part à la rédaction des Tables d'Ouloug Beg, mais mourut inachevement de cette même Comparer *Thomas Hyde* Tabulæ Ulug Beighi; Oxoniæ 1665 in 4°. Demande pour trouver numérotées de la 1re édition ad 1 lecteur n, lignes 1 à 4 et 11 à 21. La préface de la « Clé du calcul » dont je fais suivre ici la traduction, contient des indications nouvelles et intéressantes sur les autres ouvrages de Djemchid Ben Mas'oûd

Les numéros des feuillets marqués en marge des pages 66 à 75 de la traduction ci-après se rapportent à la numération écrite au crayon et mentionnée ci-dessus 1).

---

f. 0 v. Au nom de Dieu clément et miséricordieux Louange à Dieu qui est unique pour la création des unités, et qui est seul cause de la composition des nombres (2) Que sa bénédiction soit sur la meilleure de ses créatures, Mohammed, le plus puissant des intercesseurs au jour terrible de la résurrection, sur sa famille, et sur ses enfants qui gardent dans les chemins du salut et de la bonne direction

Pour en venir au fait Celui qui, parmi les créatures de Dieu, le Très-Haut, a la plus besoin de son pardon, Djamchid Ben Mas'oûd Ben Mahmoûd, le médecin, surnommé Ghyâth Alqâchâni, que Dieu fasse prospérer sa situation, dit

J'ai fait des opérations du calcul et des règles géométriques l'objet d'une étude approfondie, de sorte que j'en ai saisi les vrais procédés et que je suis parvenu au plus haut point dans leurs finesse J'en ai éclairci les parties obscures et difficiles, et j'en ai résolu les questions douteuses et compliquées. J'ai découvert des règles et des théorèmes nombreux concernant ces sciences, et j'ai obtenu la solution de problèmes qui avaient paru tellement ardus à beaucoup d'entre savants qu'ils avaient renoncé à s'en occuper C'est ainsi que j'ai refait le calcul

---

11) Le mois de Chawwâl de l'année 891 de l'hégire comprend 4 lunaisons qui correspondent respectivement aux 14, 21, 28 août et 4 septembre de l'année 1486 de J.-C. La date numérique du jour du mois manque dans le manuscrit.

(2) Dieu est le représentant par excellence de l'unité et l'unité est, par le moyen de la composition, le principe de la formation des nombres, « Il est ce corps numérorum ».

Digitized by Google

du toutes les colonnes des tables Ilkhâniennes (1) d'après les méthodes les plus exactes, et que j'ai composé les tables appelées Khâkâniennes en vue de compléter les tables Ilkhâniennes (2). J'y ai réuni tout ce que j'ai inventé en fait d'opérations astronomiques, et qui ne se trouvait point dans d'autres tables, en y ajoutant des démonstrations géométriques. J'ai composé aussi les Tables servant à faciliter les opérations, et divers autres traités.

J'ai composé, en outre, des mémoires, (tels que le mémoire intitulé le Parfait, sur les (et doutes qui se sont présentés aux anciens au sujet des distances, et des volumes, le mémoire (intitulé) le Contenant, sur le rapport du diamètre à la circonférence, et le mémoire (intitulé) la Corde et le Sinus, sur la manière de déterminer ces deux (lignes) pour le tiers d'un arc dont on connaît la corde et le sinus. Ce dernier (problème) est encore un de ceux qui ont offert des difficultés aux anciens, ainsi que l'a dit l'auteur de l'Almageste en s'exprimant à ce sujet en des termes qui signifient ce qui suit. Il n'existe pas de méthode en aucune façon, pour connaître linéairement la corde du tiers d'un arc dont on connaît la corde. Ou, puisqu'il en est ainsi, nous avons imaginé un artifice pour trouver la corde d'un degré avec une approximation très-exacte (4). Et pareillement il a dit auparavant, au sujet de la manière de trouver la corde d'un demi-degré, qu'il n'existe pas de méthode pour la déterminer (d'une manière absolue).

J'ai aussi inventé l'instrument appelé le Disque des zones, et j'ai écrit sur la manière de la construire et d'en connaître l'usage; un mémoire intitulé les Délices des savants. C'est un instrument qui sert à déterminer les longitudes vraies des planètes, leurs latitudes, leurs distances de la terre, leurs rétrogradations, les occultations et les éclipses, en tout ce qui s'y rattache.

J'ai trouvé des réponses à des questions nombreuses que m'avaient proposé les plus distingués des mathématiciens, soit pour me mettre à l'épreuve, soit pour s'instruire, et quoique ces questions n'aient pas été toutes réductibles aux six cas algébriques (3), je suis parvenu, à l'occasion de ces opérations, à des théorèmes nombreux, à l'aide desquels les opérations du calcul pouvaient être

---

(1) Les Tables Ilkhâniennes furent composées par le célèbre astronome Nacir Eddin Althoûsi l'an de l'hégire 621 et mort en 1214 de J. C.) en l'honneur du Khân mogol Houlagou qui mit fin au Khalifat de Bagdad par la conquête de cette ville en 1258 de J. C., et qui fit construire pour Nacir Eddin l'Observatoire de Marâghah.

(2) Ces mots « pour lui de » appelées » sont laissés en blanc dans le texte ms. de les a rétablis au moyen du passage correspondant fol. 1 v° du ms., dans le premier projet de la préface.

(3) Au lieu des mots « le Parfait sur les » le passage correspondant du fol. 1 v° porte: « par exemple le mémoire intitulé Lachelle du cas sur la solution des »

(4) Comparez : Composition mathématique de Claude Ptolémée, traduite etc. Par M. Halma. T. I. Paris, 1813 in-4° Pag. 34 lig. 3 et suiv. du texte grec. Il me semble qu'un cet endroit la traduction française ne rend pas d'assez près les expressions de l'original.

(5) C'est à dire à des équations le premier ou du second degré. Les six cas dont il s'agit sont représentés par les équations

$$x = a \quad x^2 = a \quad x^3 = a \quad , \quad x^2 + ax = b \quad , \quad x^2 + a = bx \quad , \quad x^3 = ax + b$$

traitées de la manière la plus aisée, d'après la méthode la plus facile, avec le moindre travail, avec la plus grande utilité, et en présentant l'exposé le plus clair.

J'ai donc jugé convenable de les rassembler dans un recueil, et j'en forme l'intention de les développer avec clarté, de manière que ce soit un manuel pour les amateurs, et un moyen d'augmenter encore la perspicacité des personnes douées d'intelligence.

l. 16 r. *Exemple.* Nous désirons (connaître) la somme des résultats des produits (formés) pour chacun des nombres jusqu'à six, (en multipliant d'abord chaque nombre) par le (nombre) suivant, puis le résultat par le (nombre) suivant. Nous additionnons (les nombres) depuis l'unité jusqu'au cinq. Ce sera quinze. Nous multiplions cela par quatorze. Il résulte deux cent dix, ce qui est la quantité cherchée (1).

Douzième règle. Si nous désirons (connaître) la somme des carrés des nombres suivant l'ordre depuis l'unité jusqu'à combien nous en voulons, nous additionnons une unité au double du dernier nombre et nous multiplions un tiers de la somme par la somme des dits nombres (2).

Exemple. Nous désirons additionner les carrés des nombres suivant l'ordre depuis l'unité jusqu'à six. Nous ajoutons au double de ce (dernier nombre) une unité. Il résulte treize, ce dont le tiers est quatre et un tiers. Nous multiplions cela par la somme des dits nombres, laquelle est vingt et un. Il résulte quatre-vingt onze.

Treizième règle. Si nous désirons additionner les cubes des (nombres) suivant l'ordre depuis l'unité (jusqu'à) combien nous en voulons, nous multiplions la somme de ces nombres par elle-même, il résultera la quantité cherchée (3).

Exemple. Nous désirons (connaître) la somme des cubes des nombres suivant l'ordre depuis l'unité jusqu'à six. Nous additionnons ces nombres. Ce sera vingt et un. Nous multiplions cela par lui-même. Il résulte quatre cent quarante et un, ce qui est la quantité cherchée.

Quatorzième règle. Si nous désirons (connaître) la somme des carré-carrés des nombres suivant l'ordre à partir de l'unité, nous retranchons de la somme de ces nombres une unité et nous prenons constamment un cinquième (4) du reste. Nous l'ajoutons à la somme des dits nombres, et nous multiplions ce qui

---

(1) $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + (n-2)(n-1)n =$
$= [1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1)]$
$[1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n]$

(2) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{2n+1}{3}[1 + 2 + 3 + \dots + n]$

(3) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = [1 + 2 + 3 + \dots + n]^2$

(4) Le texte met ici « un tiers ». Mais l'exemple qui suit prouve que ce n'est qu'une erreur de copiste.

en provient par la somme des carrés des mêmes nombres. Il resultera la quantité cherchée (1)

Exemple. Nous desirons additionner les carré-carrés des nombres suivant l'ordre depuis l'unité jusqu'à six. Nous prenons la somme de ces nombres, ce qui est vingt et un. Nous en retranchons une unité, il reste vingt. Nous en prenons le cinquième, ce qui est quatre. Nous l'ajoutons à vingt et un, il provient vingt cinq. Nous multiplions cela | par quatre-vingt onze, ce qui est la | f. 76 r.
somme des carrés des mêmes nombres. Il résulte deux mille deux cent soixante quinze.

Quinzième règle. Si nous désirons (connaître) la somme des puissances suivant l'ordre pour un nombre quelconque à partir de la première puissance, ce qui fait encore partie de ce que nous avons découvert (2), nous retranchons de la dernière puissance constamment une unité, et nous multiplions le reste par la première puissance. Nous divisons (ensuite) le résultat par un nombre moindre d'une unité que la première puissance. Ce qui resulte est ce que nous avions désiré.

Autre manière. Nous retranchons de la dernière puissance la première puissance, et nous divisons ce qui reste par un nombre moindre d'une unité que la première puissance. A ce qui en résulte nous ajoutons la dernière puissance, afin qu'il resulte la quantité cherchée (2).

Exemple de la première manière. Etc

$$(1)\quad 1^0+2^0+3^0+\dots+n^0=\left[\frac{1}{6}\{1+1+1+\dots+(n-1)+n-1\}+\frac{1}{2}\{1+2+1+\dots+n\}\right]$$

$$\left\{1^0+1^0+1^0+\dots+n^0\right\}=\frac{1}{10}\left\{6n^5+15n^4+10n^3-n\right\}$$

(1) Le texte ms. fait entrer ici le passage que voici : « nous multiplions la première puissance par la « dernière puissance et nous retranchons une unité de la première puissance; ce qui résulte est la quantité « cherchée. *Exemple.* » Après ce dernier mot le texte continue avec « Nous retranchons alo. » Il est évident que un passage en se trouve intercalé à cette place que par la négligence d'un copiste très négligent. En effet cette partie de mi- est copiée avec peu de soin

$$(2)\quad a+a^1+a^2+\dots+a^n=\frac{(a^n-1)a}{a-1}=\frac{a^n-a}{a-1}+a^n$$

99 933635

IMPRIMATUR — Fr Hier Gagli Ord Praed S P A Mag
IMPRIMATUR — P. De Villanova Castellacci Archiep Petrae Vicesg